CARACT
2010
Pisa 17-19 Novembre

LA PROCALCITONINA

G.Paternoster
Terapia Intensiva e Anestesia
Cardiovascolare
Ospedale San Carlo
Potenza

LA PROCALCITONINA (PCT)

Medscape®

www.medscape.com

Source: Thyroid © 2003 Mary Ann Liebert, Inc.

LA PROCALCITONINA (PCT)

E' il pro-ormone della calcitonina composta da 116 amminoacidi

Nell'**individuo sano** è prodotta dalle cellule C della tiroide

Altre sedi di produzione

Macrofagi

Monociti

Fegato

LA PROCALCITONINA (PCT)

ELIMINAZIONE

- Degradazione per proteolisi
- Escrezione renale 20%

PCT intatta nel filtrato durante CVVH e nel dialisato durante CVVHDF.

PCT NELLA PRATICA CLINICA

- ❖ **PCT nella diagnosi differenziale tra SIRS E SEPSI**
- ❖ **PCT nel periodo Postoperatorio**
- ❖ **PCT durante Shock Cardiogeno**
- ❖ **PCT per guidare l'Antibiotico Terapia**

PCT nella diagnosi differenziale tra SIRS E SEPSI

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

SIRS

risposta infiammatoria sistemica caratterizzata da due o più delle seguenti condizioni

- *Temperatura > 38°C o < 36°C*
- *FC > 90 bmp*
- *FR > 20 atti/min o PaCO₂ < 32 mmHg*
- *GB > 12000/mm³ o < 4000/mm³ o > 10% di forme immature*

SEPSI

risposta sistemica dell'organismo all'infezione. Manifestata da due o più condizioni cliniche:

- *Temperatura > 38°C o < 36°C*
- *FC > 90 bmp*
- *FR > 20 atti/min o PaCO₂ < 32 mmHg*
- *GB > 12000/mm³ o < 4000/mm³ o > 10% di forme immature*

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

JAMA

International Study of the Prevalence
and Outcomes of Infection
in Intensive Care Units

Vincent JL. JAMA 302:2323 (2009)

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

MINERVA MEDICA COPYRIGHT®

ORIGINAL ARTICLE

Epidemiology of Nosocomial Infection in 125 Italian Intensive Care Units

P. MALACARNE ^{1*}, D. BOCCALATTE ^{2*}, A. ACQUAROLO ^{3*}, F. AGOSTINI ^{4*},
A. ANGHILERI ^{5*}, M. GIARDINO ^{5*}, D. GIUDICI ^{6*}, M. LANGER ^{7*}, S. LIVIGNI ^{8*},
E. NASCIMBEN ^{9*}, C. ROSSI ^{5*}, G. BERTOLINI ^{5*}

Mortality in ICU due to septic shock is still very high (56%), in line with that reported by other studies (54.1% in the SOAP study ⁴).

Warren L.Lee The New England Journal of Medicine August 12 2010

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

In corso di:

infezioni batteriche gravi

sepsi

shock settico

MODS

sono state ritrovate nel sangue **alte**
concentrazioni di precursori della calcitonina
senza che vi sia un aumento dei livelli di
calcitonina

Whang et. J.Clin Endocrin Metab 1998;83:3296-3301

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

Muller et al Crit Care Med (2000) 28:977

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

PCT vs CITOCHINE

Medical and surgical ICU patients with SIRS and suspected infection (n=78)

Harbarth Am J Respir Crit Care Med 2001;164:396-402

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

In presenza di **citochine ed endotossina** la degradazione della PCT viene **bloccata** e si ritrova nel plasma con i suoi frammenti

Whang et. J.Clin Endocrin Metab 1998;83:3296-3301

adapted Linscheid Endocrinology
2003

Constitutive secretion

C-cell (thyroid)

Endocrine secretion

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

CINETICA ED EMIVITA

A 76 year old woman with peripheral artery disease
Received deproteinized hemodialysate of calf blood (out-patient "questionable procedure") found to have severe contamination with *Acinetobacter Baumannii*

Brunkhorst, Intensive Care Med 24:888-892 (1998)

PROCALCITONINA RANGE DI RIFERIMENTO

Normal Values (healthy individuals) <0.05 ng/ml	
Healthy individuals (age ≥ 4 days of life); for neonates aged 0-72 hrs, special reference ranges are used	Normal range for PCT (95% CI). No systemic inflammatory reaction
PCT <0.5 ng/ml	
Measurable but low PCT response	Low or no significant systemic inflammatory reaction. Local inflammation and local infection are possible
PCT 0.5 to 2.0 ng/ml	
Significant by moderate systemic inflammatory reaction. Infection is possible but there are various conditions also known to induce PCT (severe trauma, major surgery, cardiogenic shock)	Sepsis should be assumed and sepsis-specific treatment should be initiated, as long as there is no exclusion of diagnosis of sepsis or infection. If infection found: positive diagnosis of sepsis. Further PCT measurements recommended (6-24 hrs)
PCT ≥2-10 ng/ml	
Severe systemic inflammatory reaction, most likely due to infection (sepsis) provided no other causes known	Diagnosis of sepsis, severe sepsis or septic shock most likely. High risk of the development of organ dysfunction. If persistently high levels (>4 days): reconsider treatment of sepsis. Possibly unfavorable prognosis. Daily measuring of PCT recommended
PCT ≥ 10 ng/ml	
Marked systemic inflammatory reaction, almost exclusively as a result of severe bacterial sepsis or septic shock	Frequently associated with organ dysfunction. High risk of fatal outcome. Daily measurement of PCT level to monitor treatment success

PCT SENSITIVITY SPECIFICITY

CUT OFF ng/ml	SENS %	SPEC %	n.di pz
0.8	68	48	208
0.6	68	62	190
2	96	86	185
1.11	79	85	150
1	94	64	119
2	91	89	108
1	89	94	101
2	65	70	95
1.3	73	83	85
1.1	97	78	78
1	95	54	75

Adapted from Meisner, Procalcitonin- Biochemistry and Clinical Diagnosis (book), 2010

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

VALORE PROGNOSTICO DELLA PCT

Harbarth Am J Respir Crit Care Med (2001),

PCT NELLA DIAGNOSI DI SIRS E SEPSI

LA PCT AUMENTA ANCHE:

Dopo chirurgia

up to 7 ng/ml

Politrauma

approx 5 ng/ml

Shock Cardiogeno

up to 10 ng/ml

Neonati

up to 20 ng/ml day 2

Medications (OKT3)

up to 50 ng/ml

Ustioni

around 2 ng/ml

Circolazione Extracorporea

2 - 100 ng/ml

Alcuni tumori

up to 50 ng/ml

Cirrosi Epatica

up to 4 ng/ml

Emodialisi

approx 1 ng/ml

Syndrome di Goodpasture

approx 34 ng/ml

Alzheimer e Demenza

up to 0,6 ng/ml in

PCT NELLA PRATICA CLINICA

- ❖ PCT nella diagnosi differenziale tra SIRS E SEPSI
- ❖ PCT nel periodo Postoperatorio
- ❖ PCT durante Shock Cardiogeno
- ❖ PCT per guidare l'Antibiotico Terapia

PCT nel periodo **Postoperatorio** e durante **Shock Cardiogeno**

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

"STRESS RESPONSE" DURANTE CARDIOCHIRURGIA

Sia la chirurgia off-pump che quella on-Pump
causano SIRS per:

attivazione del complemento

IL1 β

IL6

IL8

TNF - α

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

adapted from Wan et al Chest 1997

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

- A, induction of anesthesia
- B, 5 minutes after heparin
- C, 10 minutes after starting CPB
- D, end of CPB
- E, 20 minutes after protamine
- F, 3 hours after CPB
- G, 24 hours after CPB.

In: Cohn LH, Edmunds LH Jr, eds. *Cardiac Surgery in the Adult*. New York: McGraw-Hill, 2003:349360. Menasche P, Edmunds LH Jr. Extracorporeal Circulation: The Inflammatory Response.

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

Anesthesiology 2007; 107:232-8

Copyright © 2007, the American Society of Anesthesiologists, Inc. Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

Assessment of the Accuracy of Procalcitonin to Diagnose Postoperative Infection after Cardiac Surgery

Mohamed Adel Jebali, M.D.,* Pierre Hausfater, M.D.,† Zoubeir Abbas, M.D.,* Zied Aouni, Pharm.D.,‡ Bruno Riou, M.D., Ph.D.,§ Mustapha Ferjani, M.D.¶

Jebali Anesthesiology 107:232 (2007)

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

Loebe Intensive Care Med 26 Suppl 2:S193 (2000)

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

Loebe Intensive Care Med 26 Suppl 2:S193 (2000)

PCT NEL PERIODO POSTOPERATORIO

Amour Crit Care Med 36:1147 (2008)

PCT NELLA PRATICA CLINICA

- ❖ PCT nella diagnosi differenziale tra SIRS E SEPSI
- ❖ PCT nel periodo Postoperatorio
- ❖ PCT durante Shock Cardiogeno
- ❖ PCT per guidare l'Antibiotico Terapia

PCT DURANTE SHOCK CARDIOGENO

Nello Shock Cardiogeno le
concentrazioni di PCT **sono basse**
all'inizio 1.8 ± 4.9 ng/ml rispetto
allo shock settico primario $89.5 \pm$
 133 ng/ml

Inte J cardiol 1999

PCT DURANTE SHOCK CARDIOGENO

Figure 1. The behavior of PCT levels in the first week both in septic shock (squares) and in cardiogenic shock (circles). Survived patients: continuous lines. Dead patients: dotted lines.

Picariello *Acute Card Care* : (2010)

PCT DURANTE SHOCK CARDIOGENO

Table III. Kinetics of procalcitonin levels in patients with septic shock and in those with cardiogenic shock.

	PCT 1	PCT 3	PCT 5	PCT 7	Friedman's test <i>P</i>
Septic shock					
Alive	3.94 (1.06–8.10)	2.30 (0.64–5.98)	1.38 (0.41–1.91)	0.61 (0.16–0.80)	
% baseline	100	49.5 (40.4–88.2)	25.4 (19.5–55.3)	15.7 (4.4–34.7)*	<0.001
Dead	7.48 (5.84–8.81)	3.16 (1.61–12.35)	7.13 (1.38–8.90)	3.49 (2.54–5.22)	
% baseline	100	90.8 (35.9–140.8)	97.2 (78.4–104.9)	70.8 (39.7–96.3)	0.204
Cardiogenic shock					
Alive	0.57 (0.23–9.89)	0.38 (0.24–4.98)	0.28 (0.12–5.55)	0.24 (0.09–5.03)	
% baseline	100	70.7 (65.2–87.5)	33.9 (25.0–77.3)	28.3 (21.9–41.4) ^a	0.004
Dead	1.49 (0.59–5.80)	7.00 (2.70–14.84)	5.00 (1.73–12.92)	3.64 (1.75–12.39)	
% baseline	100	125.0 (119.0–150.4)*	116.2 (86.2–116.7)	132.8 (60.0–133.7)	0.001

^a<0.05 versus baseline.

Picariello Acute Card Care : (2010)

PCT DURANTE SHOCK CARDIOGENO

ATTENZIONE

Alle prime 48 ore...

Shock cardiogeno

Insufficienza renale

Amine, IABP, CEC

Tipo di Chirurgia

PCT NELLA PRATICA CLINICA

- ❖ PCT nella diagnosi differenziale tra SIRS E SEPSI
- ❖ PCT nel periodo Postoperatorio
- ❖ PCT durante Shock Cardiogeno
- ❖ PCT per guidare l'Antibiotico Terapia

PCT per guidare l'Antibiotico Terapia

PCT PER GUIDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

MASSIMA EFFICACIA

RIDURRE LE RESISTENZE

- **DIAGNOSI RAPIDA E CORRETTA**
- **UTILIZZO DEGLI ANTIBIOTICI QUANDO SERVONO**
- **POSSIBILITA' DI SCALARE GLI ANTIBIOTICI**
- **TERAPIA DI BREVE DURATA**

PCT PER GUIDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA

OBIETTIVO

UN **ALGORITMO** BASATO SULLA
MISURAZIONE SERIATA DELLA PCT
POTREBBE

RIDURRE LA DURATA DELLA TERAPIA
ANTIBIOTICA SENZA AUMENTARE GLI
EFFETTI AVVERSI

RIDURRE LA DEGNEZA IN ICU

RIDURRE LA DEGENZA IN OSPEDALE

Nobre V et al. Am J Respir Crit Care Med 2008; 117: 498-505

BASELINE CHARACTERISTICS OF THE PATIENTS (PER-PROTOCOL ANALYSIS)

Characteristic	Control Group (n = 37)	Procalcitonin Group (n = 31)	P Value
Age, yr, mean ± SD	66.9 ± 13.8	64.0 ± 12.3	0.36
Female sex, n (%)	12 (32.4)	10 (32.3)	0.80
Baseline organ failure, n (%)			
Acidosis	20 (54.1)	14 (45.2)	0.62
ARDS D0	6 (16.2)	7 (22.6)	0.72
Coma D0	4 (10.8)	5 (16.1)	0.38
Dialysis D0	4 (10.8)	5 (16.1)	0.38
Heart failure D0	2 (5.4)	2 (6.5)	0.62
Respiratory failure D0	28 (75.7)	23 (74.2)	0.88
Shock D0	20 (54.1)	14 (45.2)	0.62
Renal failure D0	5 (13.5)	1 (3.2)	0.14
Comorbidities, n (%)			
Neoplasia	5 (13.5)	12.9	0.61
Immunosuppression	1 (2.7)	1 (3.2)	0.70
Cardiopathy	17 (45.5)	11 (35.5)	0.85
COPD	7 (18.9)	12 (38.7)	0.12
ID diabetes mellitus	2 (5.4)	0	0.29
Non-ID diabetes mellitus	6 (16.2)	12.9	0.48
Chronic renal failure	6 (16.2)	2 (6.5)	0.19
Peripheral vascular disease	1 (2.7)	1 (3.2)	0.70
Chronic hepatopathy	5 (13.5)	5 (16.1)	0.51
Baseline characteristics of sepsis			
Pulmonary sepsis, n (%)	25 (67.6)	22 (71.0)	0.96
Abdominal sepsis, n (%)	6 (16.2)	2 (6.5)	0.27
Urinary sepsis, n (%)	5 (13.5)	5 (16.1)	0.96
Other sepsis, n (%)	1 (2.7)	2 (6.5)	0.58
Septic shock, n (%)	16 (43.2)	48.4	0.85
SAPS 3, points (mean ± SD)	70.1 ± 13.1	68.5 ± 12.1	0.60
SOFA, points (mean ± SD)	6.6 ± 3.0	6.4 ± 3.3	0.74
Laboratory			
Positive blood culture, n (%)	11 (29.7)	11 (35.5)	0.80
Baseline procalcitonin µg/L, median (range)	5.4 (0.1–354)	7.3 (0.1–93)	0.76
Procalcitonin < 1 µg/L, n (%)	6 (16.2)	7 (22.5)	0.72
Adjuvant therapy for sepsis, n (%)			
Ventilatory support	30 (81.1)	26 (83.9)	0.50
vasopressors and/or inotropes	25 (67.6)	16 (51.6)	0.52

Definition of abbreviations: ARDS = acute respiratory distress syndrome; COPD = chronic obstructive pulmonary disease; D0 = Day 0; ID = insulin-dependent; SAPS = Simplified Acute Physiology Score; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment.

ALGORITMO DI TRATTAMENTO

PCT PER GUIDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

ENDOPOINTS PRIMARI

DURATA DELL'ANTIBIOTICO TERAPIA

GIORNI DI ESPOSIZIONE AGLI ANTIBIOTICI

GIORNI LIBERI DA ANTIBIOTICI

Nobre V et al; 2008

PCT PER GUIDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

ENDPOINTS SECONDARI

MORTALITA' 28 gg.

MORTALITA' OSPEDALIERA

DEGENZA IN ICU E IN OSPEDALE

Nobre V et al; 2008

TABLE 3. OUTCOMES USING PER-PROTOCOL ANALYSIS

Per-Protocol Analysis	Control Group (n = 37)	PCT Group (n = 31)	RR (95% CI)	P Value
Primary outcomes				
Duration of antibiotic therapy, first episode of infection, median d (range)	10 (3–33)	6 (4–16)	Mean difference: 3.2 (1.1 to 5.4)	0.003
Total antibiotic exposure days/1,000 d	655	504	1.3 (1.1 to 1.5)*	0.0002
Days alive without antibiotics, mean ± SD	13.6 ± 7.6	17.4 ± 7.6	Mean difference: 3.8 (0.1 to 7.5)	0.04
Secondary outcomes				
Clinical cure, n (%)	31 (83.8)	28 (90.3)	0.8 (0.5 to 1.3)	0.48
28-d mortality, n (%)	6 (16.2)	5 (16.1)	1.0 (0.5 to 1.8)	0.74
In-hospital mortality, n (%)	7 (18.9)	6 (19.4)	0.9 (0.6 to 1.7)	0.79
Sepsis-related death, n (%)	1/6 (16.6)	3/5 (60)	0.3 (0.1 to 2.0)	0.44
Primary infection relapse rate, n (%)	1 (2.7)	1 (3.2)	0.9 (0.9 to 3.7)	0.70
ICU length of stay, median d (range)	5 (1–30)	3 (1–18)	Mean difference: 4.3 (0.4 to 8.3)	0.03
Hospital length of stay, median d (range)	21 (5–89)	14 (5–64)	Mean difference: 2.2 (–1.9 to 6.3)	0.16

For definition of abbreviations, see Table 2.

* In these cases, the result expresses the index of relative risk.

Nobre V et al; 2008

Procalcitonin (PCT) algorithm for stewardship of antibiotic therapy in patients with LRTI

Procalcitonin-guided algorithms of antibiotic therapy in the intensive care unit: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Petros Kopterides, MD; Ilias I. Siempos, MD; Iraklis Tsangaris, MD; Argirios Tsantes, MD; Apostolos Armaganidis, MD

Author, (Reference)	Duration of Antibiotic Therapy in the First Episode of Infection, Days, Mean (SD)	Total Duration of Antibiotic Treatment, Days, Mean (SD)	Antibiotic-Free Days at 28 Days After Inclusion, Mean (SD)
Adults			
Bouadma (31)	6.1 (6.0) vs. 9.9 (7.1)	10.3 (7.7) vs. 13.3 (7.6)	14.3 (9.1) vs. 11.6 (8.2)
Stolz (32)	3 (0-8) vs. 5 (1-9.5)*	10 (6-16) vs. 15 (10-23)*	13 (2-21) vs. 9.5 (1.5-17)*
Hochreiter (33)	5.9 (1.7) vs. 7.9 (0.5)	NA	NA
Schroeder (34)	6.6 (1.1) vs. 8.3 (0.7)	NA	NA
Nobre (35)	6 (3-34) vs. 9.5 (2-33)*	8 (4-27) vs. 14 (6-39)*	15.3 (8.9) vs. 13.3 (8.2)
Svoboda (36)	NA	NA	NA
Neonates			
Stocker (37)	79.1 vs. 101.5†	NA	NA

CI, confidence interval; ICU, intensive care unit; LOS, length of stay; NA, not available/applicable; OR, odds ratio.

*These values are referred to median (range) instead of mean (SD).

†Data represent hours, not days.

PCT PER GUIDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

GIORNI DI TERAPIA ANTIBIOTICA

Kopterides et al; 2010

PCT PER GUIDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

MORTALITA' 28 GIORNI

Kopterides et al; 2010

CONCLUSIONI

- ✓ LA PCT E' UTILE NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA SIRS E SEPSI
- ✓ ATTENZIONE AL PAZIENTE POSTOPERATO
- ✓ ATTENZIONE ALLO SHOCK CARDIOGENO
- ✓ E'UTILE NEL GIUDARE L'ANTIBIOTICO TERAPIA

CONCLUSIONI

- ✓ **NO UNA SINGOLA MISUARZIONE SEGUIRE IL TREND**
- ✓ **ASSOCIARLA AGLI ALTRI PARAMETRI ED ALLA SITUAZIONE CLINICA**
- ✓ **RICORDIAMOCI DELLE ALTRE CONDIZIONI CLINICHE IN CUI AUMENTA**

PCT BIOMARKER O TOSSINA?

Procalcitonin has bioactivity at calcitonin receptor family complexes: Potential mediator implications in sepsis*

Patrick M. Sexton, PhD; George Christopoulos, BSc; Arthur Christopoulos, PhD; Eric S. Nylen, MD; Richard H. Snider Jr., PhD; Kenneth L. Becker, MD, PhD

gpaternoster@teletu.it